



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 3-2-1999**

**Αριθ.Πρωτ.:88135**

**Ταχ.Δ/νση:Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ.Κόδικας:10164 Αθήνα  
Πληροφορίες:Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο:5291411**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο γεωργικό  
φάρμακο (μυκητοκτόνο)  
CEQUIPHANATE 70 WP.**

**ΠΡΟΣ:1. ΕΜΑΒΙΠ  
Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α.ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 19  
104 32 ΑΘΗΝΑ  
(Με απόδειξη)  
2.Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α.Δ/νσεις Γεωργίας  
Εδρες τους  
β.Δ/νσεις Εμπορίου  
Εδρες τους  
4.Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2 ,14561 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.:Αποδέκτες Π.Δ**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ. 8.
- Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/B/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
- Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/B/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ Α/30-5-97) Π.Δ.
- Τη με αριθ. 78629/10-7-91 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6533 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα THIOPHANIC-M 70 WP.
- Τη με αριθ 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/B/ 9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ. κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
- Τις από 7-8-97 και 28-9-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 28-9-98 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

## Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6737 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** CEQUIPHANATE 70 WP.
  2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** thiophanate methyl 70% β/β  
βοηθητικές ουσίες : 26,32 % β/β
  4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 95 % min.
  5. **Παρασκευαστής:** CEQUISA S.A. Ισπανία
  6. **Αντιπρόσωπος:** EMABIP, Θ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α.ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε. Χαλκοκονδύλη 19 10432 Αθήνα
  7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
  8. **Συσκευαστής:** ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ, Μάνδρα Αττικής
  9. **Συσκευασία:** 9a. **Είδος -Μέγεθος:** a1. Σακίδιο 70 γρ.και 175 γρ.  
a2.Σακούλα μέσα σε κουτί 250, 500, 600 γρ., και 1 κιλού.  
9b. **Υλικό:** b1. Σακίδιο από πολυαιθυλένιο εσωτ./αλουμίνιο/πολυεστέρα εξωτ.  
b2. Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο.

**10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

**11.Τρόπος εφαρμογής:**

- α.Ψεκασμός φυλλώματος.
- β.Εμβάπτιση καρπών (μετασυλλεκτικά).
- γ.Ριζοπότισμα

**12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13.Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά	Σήγψεις καρπών (Penicillium italicum, P.digitatum)	70-140	Ψεκασμός ή εμβάπτιση καρπών αμέσως μετά τη συγκομιδή.
Μηλιά, Αχλαδιά	Ωίδιο (Podosphaera leucotricha)	70	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ψεκασμός στα στάδια της πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής και όταν έχουν πέσει τα πέταλα.
	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V.pirina)		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά	Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) Ωίδιο (Podosphaera oxyacanthe, Sphaerotheca pannosa)	70	Ψεκασμός εφόσον διαπι- στωθεί πρόβλημα στην αρχή της άνθησης και επανάληψη στην πλήρη άνθηση.

Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα	Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών ( <i>Gloeosporium</i> spp, <i>Penicillium</i> spp, <i>Botrytis</i> spp.)	70	Ψεκασμός ή εμβάπτιση καρπών αμέσως μετά τη συγκομιδή.
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> ) Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> )	70-100	Ψεκασμός εφόσον διαπι- στωθεί πρόβλημα πριν ή μετά την άνθηση.
Φράουλα	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca</i> <i>macularis</i> ) Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.
Τομάτα	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium</i> <i>fulvum</i> ) Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> ) Σκληρωτινίαση ( <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> )	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.
Μελιτζάνα	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Σκληρωτινίαση ( <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> )	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> ) Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Ανθράκωση ( <i>Colletotrichum</i> <i>lagenarium</i> ) Σκληρωτινίαση ( <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> )	70-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.
Καρπούζι, Μελιτζάνα, Τομάτα	Προσβολή από Φουζάριο ( <i>Fusarium</i> spp)	70-100	Ποτίζουμε τα φυτά , με 200- 300 κ. εκ. διαλύματος ανά φυτό.

Λάχανο, Κουνουπίδι	Σκληρωτινίαση (Sclerotinia spp)	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
Καπνός	Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum)	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
Ζαχαρότευτλα	Κερκόσπορα (Cercospora beticola)	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
Καλλωπιστικά	Ωίδιο (Oidium spp.)	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

#### Παρατήρηση:

Στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

#### Περιορισμοί κατα τη χρήση:

- Μην αυξάνετε τις δόσεις.

Σε περίπτωση ανθεκτικότητας συμβουλευθείτε γεωπόνο.

Στην ετικέτα του σκευάσματος να αναγράφεται η φράση « ΠΡΟΣΟΧΗ» ο μύκητας Botrytis cinerea αναπτύσσει εύκολα ανθεκτικότητα στο CEQUIPHANATE 70 WP.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα θερμοκήπια. Στην περίπτωση που έχει ήδη αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, κανένα άλλο μικητοκτόνο με δρώντα συστατικά carbendazim, benomyl και thiophanate-methyl δεν πρόκειται να δώσει αποτελέσματα.

#### 14.Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### 15.Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Σε περίπτωση ανάμειξης με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα, η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του μίγματος.

#### 16.Σημάνσεις:

Τοξικότητας: Xn, Επικίνδυνο

#### 17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R40) Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

#### 18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(RO2) Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες

(RO5) Τοξικό για τα ψάρια.

**19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακρυά από παιδιά.  
(S13) Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
(S20/21) Οταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.  
(S23) Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.  
(S36/37) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  
(SY7) Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.  
(SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.  
(SY10) Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

**Ελαφράς μορφής δηλητηρίαση**

Συνιστάται υποδόρια ένεση με 1-4 αμπούλες (0,5 MG/αμπούλα), θειϊκής ατροπίνης. Κάθε αμπούλα, μπορεί να χορηγείται με διαλείμματα 15-20 λεπτών. Για τη χορήγηση πρόσθετης δόσης εξετάζεται η κατάσταση των ματιών, του στόματος και του λάρυγγα.

**Βαριάς μορφής δηλητηρίαση**

Συνιστάται χορήγηση 10 ενδοφλέβιων ενέσεων θειϊκής ατροπίνης ελέγχοντας τη διαστολή των ματιών. Στη συνέχεια 5 αμπούλες ακόμη μπορούν να χορηγηθούν ενδοφλέβια μέχρι να εξαφανισθεί εντελώς η διαστολή των ματιών.

Μετά τα ανωτέρω μπορούν να χορηγηθούν 2 ακόμη αμπούλες θειϊκής ατροπίνης υποδόρια μέχρι να εξαφανισθούν εντελώς τα συμπτώματα.

Δεν πρέπει σε περίπτωση προσβολής από το φάρμακο να χορηγείται μορφίνη ή PAM.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων:(01) 7793777**

**21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις)**

- (SO2) Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.  
(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22.Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**

**23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:14 ημέρες  
(Π3) Οι καρποί που έχουν εμβαπτισθεί σε CEQUIPHANATE 70 WP δεν πρέπει να καταναλωθούν πριν περάσουν 2 μήνες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί αν προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων, καθώς και για το περιβάλλον.

**24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II.Ετικέτα:**

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ.1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ**