



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
E-mail: syg046@minagric.gr

ΘΕΜΑ:“Χορήγηση οριστικής
έγκρισης στο φυτο-
προστατευτικό προϊόν
(ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο)
DELETE 8 SC”

Αθήνα, 30-09-2008

Αριθ. πρωτ.: 122883

ΠΡΟΣ: DELTA GAMMA AGRO ABEE
Αλαμάνας 20, 14121-N. Ηράκλειο
(με απόδειξη)

KOIN.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α' /104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β' /674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β' /599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) KYA με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) KYA, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β' /8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της KYA 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 120547/10.9.2007 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2143 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KEYSTAR 8 SC, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία και έχει την ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
6. Τον κανονισμό 149/29.1.2008 (L 58/1.3.2008) της Επιτροπής “για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού”.

7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
8. Τη αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 07-07-2008, 07-08-2008 και 08-08-2008 αιτήσεις του ενδιαφερομένου, καθώς και το από 08-08-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία DELTA GAMMA AGRO ABEE, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **2170** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο) DELETE 8 SC, με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** DELETE
- 2. Είδος (μορφή) σκευάσματος:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** bifenthrin 8% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 92,63% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97% min.
- 5. a. Παρασκευαστής της δ.ο.:** JIANGSU QIAOJI BIOCHEM Co, LTD, Κίνα.
- β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** JIANGSU QIAOJI BIOCHEM Co, LTD, Κίνα. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας bifenthrin, όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και η (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 22-10-2007 (αριθ. πρωτ. YAA&T 123237) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
- 6. a. Κάτοχος της έγκρισης:** DELTA GAMMA AGRO ABEE, Αλαμάνας 20, 14121–N. Ηράκλειο.
- β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** ---
- γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** DELTA GAMMA AGRO ABEE, Αλαμάνας 20, 14121–N. Ηράκλειο.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** DELTA GAMMA AGRO ABEE, Αλαμάνας 20, 14121–N. Ηράκλειο..
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BIOPYL A.E., Ελαιώνας Θηβών
- 9. a. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** BIOPYL A.E., Ελαιώνας Θηβών
- β. Συσκευασίες:** -ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Φιάλες των 10, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 750 κ.εκ. 1, 2 και 5 λίτρων.
-ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: HDPE (με χάρτινο κουτί για τις μικρές συσκευασίες).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο της ομάδας των συνθετικών πυρεθρινών με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών, μυζητικών εντόμων και ακάρεων..

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Ανακινείστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση.
- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
- Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό) *	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤ. ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.)	Μέγιστη ποσότητα (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά Αχλαδιά	-Φυλλορύκτες (Phyllonorycter corylifoliella, Phyllonorycter blancardella, Cemiostoma scitella) -Κόκκινος τετράνυχος (κινητές μορφές) (Panonychus ulmi) -Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadrapsidiotus perniciosus) -Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri)	50 25 50-62,5	100-200	100 50 125	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.
Ροδακινιά	-Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) -Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadrapsidiotus perniciosus) -Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona) -Ανάρσια (Anarsia lineatella) -Καρπόκαγγα (Cydia molesta) -Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)	25 50	150-250	62,5 125	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.
Αμπέλι	-Ευδεμίδα (Lobesia botrana) -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (Eutetranychus carpini, Tetranychus urticae)	31,25-37,5 50	50-150	46,875 75	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.
Λαχανικά: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα,	-Πράσινη αφίδα (Aphis spp.) -Μαρώη αφίδα (Myzus spp.) -Αλευρώδης	12,5-25	50-100	25	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί.

Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλια, Καρπούζι, Πεπόνι	(Trialeurodes vaporariorum) -Υπονομευτής (Liriomyza bryoniaeae) -Φυλλοφάγες κάμπιες (Plusia chalcites) -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (Tetranychus spp., Aculus spp.)	50		50	Μέγιστος αριθμός εφαρ- μογών ανά καλλιεργητι- κή περίοδο : 2 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.
Βαμβάκι	-Αφίδες (Aphis gossypii) -Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) -Ρόδινο σκουλήκι (Platyedra gossypiella) -Ακανθώδες σκουλήκι (Earias insulana) -Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (Tetranychus spp.)	50-100	50-80	80	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρ- μογών ανά καλλιεργητι- κή περίοδο : 2 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.
Καλλωπιστικά	-Αφίδες (Aphis spp., Myzus spp.) -Θρίπες (Thrips spp.) -Κάμπιες λεπιδοπτέρων -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (Tetranychus spp.)	25-37,5	50-100	37,5	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εάν χρειασθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρ- μογών ανά καλλιεργητι- κή περίοδο : 2 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τουλάχιστον 14 ημέρες.

*: οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξής τους.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα: ---

16. Σημάνσεις: Xn – Επιβλαβές N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):

(R_{20/22}) -Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

(RO₁) -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

(R_{50/53}) -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:

(S_{1/2}) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S₁₃) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S_{20/21}) -Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

(S₂₃) -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

(S36/37/39) Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

(S38) Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση κατάποσης: μη προκαλείτε εμετό. Καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφύλαξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

(SO₁) -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

(S₆₀) -Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

(S₆₁) -Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις: (A₁) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

-Απαγορεύεται να βοσκήσουν ζώα στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 3 εβδομάδες από την εφαρμογή.

-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

23.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
bifenthrin	Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

23.2 (Π₁) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Αμπέλι, Βαμβάκι : 21 ημέρες

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλια : 7 ημέρες

Καρπούζι, πεπόνι: 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό (θερμοκρασία < 25 °C), ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Π. Ετικέτα:

- α)** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση. Στην ετικέτα του σκευάσματος δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
- β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ