



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 5-5-2008

Αριθ. Πρωτ.: 118393

Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
DELAN 70 WG, ως προς το
μέγεθος συσκευασίας, το
εργοστάσιο συσκευασίας και το
φάσμα δράσης.”

ΠΡΟΣ: Basf Agro Ελλάς ΑΒΕΕ
Αιγιαλείας 48, Παράδεισος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αντοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ' & Ε' της Δ/νσης μας
7) Γραμματεία της Δ/νσης μας

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
- Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/B/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ. 2 και 5.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
- Το Π.Δ. 206/2007 /(ΦΕΚ 232/A/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
- Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».

6. Τις από 20-12-2007 και 27-3-2008 αιτήσεις της εταιρείας Basf Agro Ελλάς ABEE, για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματός της DELAN 70 WG.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6956** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **DELAN 70 WG** (dithianon 70% β/β), παρασκευής της εταιρείας BASF Agro B.V., Ελβετία, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία Basf Agro Ελλάς ABEE με τη με αριθ. 102232/4-5-2004 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (τροποποιήθηκε με την αριθ. 116195/21-2-2007 απόφασή μας), ως προς **A) το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, B) το μέγεθος συσκευασίας και Γ) το φάσμα δράσης**, τα οποία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

A. Εργοστάσια συσκευασίας σκευάσματος:

- STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Ιταλία, για τις συσκευασίες (σακούλες-φιάλες), μεγέθους: 100, 250, 500 γρ. και 1, 2, 5 και 10 κιλών.
- **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ABEE**, ΒΙ.ΠΕ.Θ., για τη συσκευασία (σακούλα-φιάλη), μεγέθους: **350 γρ.**

B. Συσκευασία: a. Είδος - Μέγεθος: α1. Σακούλες 100, 250, **350**, 500 γρ. και 1, 2, 5 και 10 κιλών.
α2. Φιάλες 100, 250, **350**, 500 γρ. και 1, 2, 5 και 10 κιλών.

β. Υλικό: β1. Χαρτί/PE ή Χαρτί/AL/PE.

β2. Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Γ. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	Όγκος Ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ	Μέγ. αριθμός εφαρμογ ανά καλλιεργ περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> <i>V.pirina</i>)	80 (πριν την άνθηση) 50 (μετά την άνθηση)	100-200	80-160	4	Πράσινη κορυφή, ρόδινη κορυφή, πτώση πετάλων, 10-15 ημέρες αργότερα, (καρπίδιο).
	Φαιά σήψη (<i>Monilinia spp.</i>)	75-100		75-200		Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών. λευκή ή ρόδινη κορυφή, πλήρη άνθηση. Εφαρμογές το καλοκαίρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
	Σήψεις καρπών (<i>Gloeosporium spp.</i> <i>Physalospora spp.</i>)	75-100		75-200		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά,	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100	150	150	2	Δύο εφαρμογές: στη ρόδινη κορυφή και στην άνθηση.
Κερασιά, Δαμασκηνιά		35	150	50		

Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Κορύνεο (<i>Stigmina carpophila</i>)	80-100 35	150 150	120-150 50		Δύο εφαρμογές: μία το φθινόπωρο (πτώση 75% των φύλλων) ή το χειμώνα (πριν τη διόγκωση των οφθαλμών) και η δεύτερη την άνοιξη στην έναρξη της βλάστησης.
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> , <i>Taphrina pruni</i>)	80-100	150	120-150		Μια εφαρμογή κατά ¹ την περίοδο του χειμερινού λήθαργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κερασιά, Δαμασκηνιά		35	150	50		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	80-100	50-100	40-100	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Έκπτυξη οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στάδιο 2-3 φύλλων.
	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	100		50-100		
Λυκίσκος	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)	65-100	250	160-250	4	α. Όταν οι βλαστοί ευρίσκονται στα 3/4 της διαδρομής των επί των υποστηριγμάτων β. Όταν οι βλαστοί φθάσουν στην κορυφή των υποστηριγμάτων. γ. Λίγο πριν την άνθηση, και δ. Αμέσως μετά την άνθηση.
Χρυσάνθεμο Τριανταφυλλιά	Σεπτορίωση (<i>Septoria spp.</i>) Μελανή κηλίδωση φύλλων (<i>Diplocarpon rosae</i>)	100	50-100	50-100		Προληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλοειδή 4, Πυρηνόκαρπα 2, Αμπέλι 4, Λυκίσκος 4.

Παρατηρήσεις

- Στο φουζικλάδιο εκτός από προστατευτικά δρα και θεραπευτικά εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από τη βροχή που την προκαλεί).
- Στις καλλιέργειες μηλοειδή, αμπέλι και πυρηνόκαρπα να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Δεν διασπάται εύκολα γι' αυτό μετά τους πρώιμους ψεκασμούς να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου πάνω στο φύλλωμα των φυτών.

II. Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 149/2008.

III. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/A/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/B'/19-9-2002) KYA και με την παρούσα απόφαση.

IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν οι με αριθ. 102232/4-5-2004 και 116195/21-2-2007 αποφάσεις μας, όπως ισχύουν σήμερα.

**E. Y.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΣΤ. ΣΕΝΗ