



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Γ. Τσάμπα  
Τηλέφωνο : 210 92 87 228  
FAX : 210 92 12 090

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) DIFFERENCE 50 SC**

Αθήνα, 05 - 05 - 2008

Αριθ. πρωτ: 118601

**ΠΡΟΣ: NUFARM SAS  
(δια της κ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ Ε. ΛΕΦΑΚΗ  
Εφέσου 28,  
171 21, Νέα Σμύρνη, Αθήνα)  
(με απόδειξη)**

**KOIN.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας  
7) Γραμματεία της Δ/νσής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/A/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/B/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/B/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/B'/19-9-2002) KYA με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/B/6-7-2006) KYA καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/B'/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της KYA 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθμό 83044/30.12.1998 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 7557 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας περιεκτικότητας και ιδίας μορφής φυτοπροστατευτικό προϊόν COTOLINT 50SC.

6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Fluometuron.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 26-9-2007 και 11-4-2008 αιτήσεις της κ. Ευτυχίας Λεφάκη, για λογαριασμό της εταιρίας Nufarm SAS, Γαλλίας, και με το από 11-4-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**I. Χορηγούμε στην εταιρεία Nufarm SAS, Γαλλίας οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό 7860 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:**

- 1. Εμπορικό όνομα: DIFFERENCE 50 SC**
- 2. Μορφή:** Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** fluometuron 50 β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 55,23 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% min.
- 5. a. Παρασκευαστής της δ.ο.: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Αυστρία**  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία**  
(Η Δ/νση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και στ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 26.09.2007 (αριθ. πρωτ. YAA&T 122652) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
- 6. a. Κάτοχος της έγκρισης:** Nufarm SAS, 28 bv Camélinat, 92233 Gennevilliers Cedex, Γαλλία  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** Ευτυχία Ε. Λεφάκη, Εφέσου 28, 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. a. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** Nufarm SAS, 28 bv Camélinat, 92233 Gennevilliers Cedex, Γαλλία.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία (Η δ/νση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Αυστρία
- 9. Συσκευασία:**
  - a. Είδος-Μέγεθος:** i) Φιάλες των εκατό (100), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250), τετρακοσίων (400) πεντακοσίων (500) κ. εκ. και ενός (1) λίτρου  
ii) Δοχεία των δύο (2), δυόμιση (2.5), πέντε (5), δέκα (10), είκοσι (20) και εικοσιπέντε (25) λίτρα
  - β. Υλικό συσκευασίας:** Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Προφυτρωτικό-μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**  
Ομοιόμορφος ψεκασμός αμέσως μετά τη σπορά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων, όταν έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση, με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας.

## 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά το φάρμακο, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

## 13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαμβάκι	Καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.	250-500	30-60	Αμέσως μετά τη σπορά.	1
		200	30-60	Μεταφυτρωτικά όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ.	1

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφρά εδάφη.
- Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του να ακολουθεί βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ.
- Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 κ.εκ. ανά στρέμμα, τότε δεν πρέπει να φυτεύονται μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα, μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει 1 χρόνος.

### 4. Ετήσια ζιζάνια:

#### Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*)

Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*)

Σετάριες (*Setaria spp.*)

Τήρες (*Lolium spp.*)

#### Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)

Βλήτο (*Amaranthus spp.*)

Χαμομήλι (*Chamomilla recutita*)

Λουβουδιές (*Chenopodium spp.*)

Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Gallium aparine*)

Αντράκλα (*Portulaca oleracea*)

Μαρτιακός (*Senecio vulgaris*)

Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)

Άγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)

Λάπαθο (*Rumex spp.*)

Άγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)

Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)

#### Ανθεκτικά ζιζάνια (τα πιό σημαντικά):

Άγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*)

Άγριοϊβίσκος (*Hibiscus trionum*)

Μολόχα (*Malva spp.*)

Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*)

## **5. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις)**

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3** Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του.
- SZ5** Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6** Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- SZ7** Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- SZ9** Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από τρεις (3) ατμόσφαιρες (45 PSI)
- SZ10** Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
- SZ12** Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

## **14. Φυτοτοξικότητα:**

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

## **15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα**

## **16. Σημάνσεις : Xn - Επιβλαβές N – Επικίνδυνο για το Περιβάλλον**

## **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R22** - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

## **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):**

- RO2** Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

## **19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- S29** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

## **20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :**

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με σαπούνι και άφθονο νερό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Αν καταποθεί κάνετε πλύση στομάχου. Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- SO2** Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τις συσκευασίες που θα καταστραφούν προηγουμένως, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ---**

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Αποθηκευόμενο στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές θερμοκρασίες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον μακριά από απ'ευθείας έκθεση στο φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**II. Ετικέτα:**

- α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/A/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/B/19-9-2002) KYA και με την παρούσα Απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

K. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΣΤ. ΣΕΝΗ