



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ακαρεοκτόνο) AGROTHIAZOX
10 WP"**

Αθήνα, 30-10-2008

Αριθ. πρωτ.: 124211

**ΠΡΟΣ: SHARDA EUROPE B.V.B.A.,
Βέλγιο (δια της κ. Νένης Γκούμα
Αγ. Νικολάου 29
ΓΛΥΦΑΔΑ)
(με απόδειξη)**

- KOIN.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α' /104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
- Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β' /674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
- Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β' /599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
- Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) KYA με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) KYA, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β' /8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της KYA 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
- Τη με αριθ. 120902/16.7.2008 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2167 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν HEXYTHIAZOX-NITROFARM 10 WP, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία και έχει την ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
- Τον κανονισμό 149/29.1.2008 (L 58/1.3.2008) της Επιτροπής “για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού”.
- Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').

8. Τη με αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού"".
9. Τις από 27-12-2007, 15-2-2008, 19-9-2008 και 25-9-2008 αιτήσεις της κ. Νένης Γκούμα για λογαριασμό της εταιρείας SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βελγίου, καθώς και το από 25-9-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βελγίου, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **2172** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (ακαρεοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** AGROTHIAZOX 10 WP
- 2. Είδος (μορφή) σκευάσματος:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** hexythiazox 10% β/β
βοηθητικές ουσίες: 89,80% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 98% min.
- 5. a. Παρασκευαστής της δ.ο.:** SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Ινδία.
- β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Ινδία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας hexythiazox, όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και η (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 27-12-2007 (αριθ. πρωτ. YAA&T 125339) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
- 6. a. Κάτοχος της έγκρισης:** SHARDA EUROPE B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο.
- β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** κ. Νένη Γκούμα, Αγ. Νικολάου 29, Γλυφάδα.
- γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** SHARDA EUROPE B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Plot No. 169/1/A, GIDC NARODA, PHASE-I, AHMEDABAD, GUJARAT, Ινδία.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Ινδία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 9. a. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ELLAAGRIT A.B.E.E., Μάνδρα Αττικής.
- β. Συσκευασίες:** -ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
 - i) φάκελοι των 80 γραμμαρίων.
 - ii) Σακίδια των 200 και 400 γραμμαρίων.**-ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**
 - i) αλουμίνιο-σελοφάν-πολυαιθυλένιο.
 - ii) πολυαιθυλένιο (εντός χαρτοκυτίου).
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης:** Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως μεγάλου όγκου με ψεκαστικά μέσα υψηλής πίεσης.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
 - Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
 - Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
 - Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (γραμ. / 100 λίτρα ψεκ.υγρό) | ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤ. ΥΓΡΟΥ (λίτ./στρ.) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (γραμ. / στρ.) | Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1), (2), (6) |
|-------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|
| Μηλιά, Αχλαδιά | - Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30-50 | 100-200 | 100 | 1 | Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής (3), (4). |
| Ροδακινιά | - Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30-50 | 150-250 | 125 | 1 | Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής (3), (4). |
| Αμπέλι | - Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30-50 + ακμαιοκτόνο | 50-150 | 75 | 1 | Άνοιξη ή σε περίπτωση πρώιμου καλοκαιριού, 2-3 εβδομάδες μετά την άνθηση μόλις φανούν οι πρώτες κινητές μορφές ακάρεων (4) |
| Βαμβάκι | - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40 + ακμαιοκτόνο (στα 2/3 της πλήρους δοσολογίας) | 50-80 | 32 | 1 | Όταν τα φυτά έχουν ύψος 40 εκατ. (5) |

Παρατηρήσεις :

1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Επειδή το δραστικό συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.
3. Χρησιμοποιείται σε ένα μόνο ψεκασμό το έτος από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ψεκασμός αυτός δεν γίνει αρκετά νωρίς και έχουμε μεγάλο αριθμό ακμαίων, να χρησιμοποιείται μίγμα του σκευάσματος με ένα συμβατό ακμαιοκτόνο.
5. Επειδή το σκεύασμα πρέπει να συνδυάζεται με ακμαιοκτόνο σκεύασμα δεν είναι απαραίτητο να ψεκάζουμε νωρίς, δηλαδή πριν ορισμένα άτομα του τετρανύχου φθάσουν στο στάδιο του ακμαίου.
6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μετά την εφαρμογή με το σκεύασμα, ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία clofentezine ή και το αντίθετο, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο, προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα: ----

16. Σημάνσεις: Χι-ερεθιστικό, Ν – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):

- (R₃₆) -Ερεθίζει τα μάτια.
 (R₃₇) -Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

- (RO₃) -Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
 (R_{51/53}) -Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 Επιβλαβές για την εδαφική πανίδα.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:

- (S_{1/2}) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 (S₁₃) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 (S_{20/21}) -Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 (S₂₃) -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
 (S₂₅) -Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
 (S₂₆) -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβιυλή.
 (S₃₉) -Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου.
 (S₅₁) -Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 (SY₁₁) -Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση αυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβιουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφύλαξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

- (S₆₁) -Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια μιαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις: (A₁) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
 -Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

| 23.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) | Προϊόντα | MRLs (mg/kg) |
|--|---|-----------------|
| hexythiazox | Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs με τον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 | |

23.2 (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι : 35 ημέρες
 Ροδακινιά : 14 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

- α)** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.
- β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ

