



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ.Δ/νση: **Ιπποκράτους 3-5**
Ταχ.Κώδικας: **10164 Αθήνα**
Πληροφορίες: **Ν. Ξενούλης**
Μ. Φουντουλάκης
Τηλέφωνο: **52 91 412**
36 37 457

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο)
DANADIM 40 EC”

Αθήνα, 20-03-2000

Αριθ. πρωτ.: 90773

ΠΡΟΣ:1. Ανοργκαχήμ Α.Ε.
Μουρούζη 9
106 74 Αθήνα
(με απόδειξη)
2.Δ/νσεις Γεωργίας
‘Εδρες τους
3.Δ/νσεις Εμπορίου
‘Εδρες τους
4.Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2 ,14561 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 2. και το άρθρο 5 παρ.2 και 8.
- Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
- Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
- Τη με αριθ. 89560/17-2-99 απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **1788** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο σκεύασμα **SINGFOS 40 EC**.
- Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (Β 1165/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».

5. Τις από 26-8-97, 9-7-98, 30-10-98 και 12/11/99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 25-10-99 πρωτόκολλο πληρότητας.

A π o φ a σ i ζ o n μ e

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 1870 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα** : DANADIM 40 EC
 2. **Μορφή** : Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dimethoate 40% β/ο
βοηθητικές ουσίες 61,2% β/β
 4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται :96% min.
 5. **Παρασκευαστής** : CHEMINOVA AGRO A/S, P.O. Box 9, DK-7260 Lemvig, Denmark
 6. **Αντιπρόσωπος** : ANOPΡΓΚΑΧΗΜ A.E., Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα
 7. **Τυποποιητής** : CHEMINOVA AGRO A/S
 8. **Συσκευαστής** : CHEMINOVA AGRO A/S
 9. **Συσκευασία** : **9a. Είδος -Μέγεθος :** i) Φιάλες των **50, 100, 150, 200, 250, 500** και **1000** κ.εκ.
ii) Δοχεία των **5** λίτρων

9β.Υλικό : PET, FHDPE, COEX , Αλουμίνιο.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται- τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο που δρά δι'επαφής και από στομάχου. Καταπολεμά έντομα και ακάρεα.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπέκ τύπου κώνου και δολωματικοί ψεκασμοί (μικρού όγκου από εδάφους και πολύ μικρού όγκου από αέρος).

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

12.1.-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση .

- Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

12.2. -Για τους δολωματικούς ψεκασμούς:

Πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση θα πρέπει να είναι εντονότερη.

13.Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13.1. Εσπεριδοειδή	Mύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)	75	α.Ψεκασμοί καλύψεως. (όπως στην εληά)
Γκρέιπ φρούτ Λεμονιά Μανταρινιά Πορτοκαλιά		0,3% (στο δόλωμα)	β.Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Ποσότητα

Φράπα			δολώματος: 3 λίτρα ανά στρέμμα.
	0,9% (στο δόλωμα)	γ.Δολωματικοί ψεκασμοί πολύ μικρού όγκου (VLV).	
		Ποσότητα δολώματος: 1 λίτρο/ στρέμμα.	
		Ψεκασμοί καλύψεως. (όπως στην εληά)	
	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus persicae</i>)	75	
	Ακάρεα (<i>Aceria sheldoni</i> , <i>Phyllocoptura oleinorus</i> , <i>Tydeus spp.</i>)		

13.2. Ακρόδρυα

13.2.1. Αμυγδαλιά	Ευρύτομο (<i>Eurytoma amygdali</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
	Ρυγχίτης (<i>Rhinchites bacchus</i>)		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus amygdali</i>)		

13.2.2. Καρυδιά

13.2.2. Καρυδιά	Καρπόκαψα (<i>Carpocapsa pomonella</i>)	100	Ψεκασμοί καλύψεως
-----------------	--	-----	-------------------

13.2.3. Λεπτοκαρνά

	Βαλάνινος (<i>Balaninus spp.</i>)	100	Ψεκασμοί καλύψεως
--	--	-----	-------------------

13.3. Μηλοειδή

Μηλιά	Οπλοκάμπη (<i>Hoplocampa brevis</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
Αχλαδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>)		
	Φυλλορύκτες (<i>Lyonetia spp.</i> , <i>Cemostoma scitella</i> , <i>Phyllonorycter coryfoliella</i> , <i>P. blancartella</i>)		
	Τίγρης (<i>Stephanitis pyri</i>)		
	Ρυγχίτης (<i>Rhinchites bacchus</i>)	100-125 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως
	Τετράνυχοι	100-125	

(*Panonychus ulmi*)

13.4. Πυρηνόκαρπα

13.4.1. Βερικοκιά

Οπλοκάμπη (<i>Hoplocampa minuta</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)		
Ακάρεα (<i>Panonychus ulmi</i>)		

13.4.2. Κερασιά

Βυσσινιά

Ραγολέτιδα (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
Αφίδες (<i>Myzus cerasi</i>)		»
Ρυγχίτης (<i>Rhinchites bacchus</i>)	100-125 (1)*	
Ακάρεα (<i>Panonychus ulmi</i>)	100-125	»

13.4.3. Ροδακινιά

Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Brachycaudus spp.</i>)		
Ακάρεα	100-125(1)*	»
Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>)	100-125	»

13.5. Αμπέλι

Ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae	100-125 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως
(<i>Eriophyes vitis</i> κ.α.)		

13.6. Συκιά

Λόγχαια (<i>Lonchea aristella</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
---	----	-------------------

13.7. Εληνά

Δάκος (<i>Dacus oleae</i>)	75 (5,6,7)	a. Ψεκασμοί καλύψεως: Αρχίζουν με την έναρξη της προσβο-λής και επαναλαμ-βάνονται όταν διαπι-στωθεί ενεργός προ-σβολή και όχι πριν από 20 ημέρες από τον προηγούμενο ψεκαζμό.
---------------------------------	---------------	---

Δάκος (<i>Dacus oleae</i>)	0,3% στο δόλωμα	β. Δολωματικοί ψεκασμοί μικρου όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέ-λη Ιουνίου- αρχές Ιουλίου και επανα-λαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρίψεων ακμαίων και των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότης δολώματος: 3 λίτρα ανά στρέμμα.
Δάκος (<i>Dacus oleae</i>)	0,9% (στο δόλωμα)	γ. Δολωματικοί ψεκασμοί πολύ μικρού όγκου (VLV) μόνο από αέρος. Ποσότης δολώματος 1 λίτρο ανά στρέμμα. Οι ψεκασμοί αρχίζουν και συνεχίζονται όπως και οι ψεκασμοί μικρού όγκου από το έδαφος.

Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>) Φλοιτρίβης (<i>Phloeotribus scarabeoides</i>) Ρυγχίτης (<i>Rhinchites bacchus</i>) Φυλλοφάγα έντομα : (<i>Lyonetia spp</i> , <i>Cacoecia rosana</i> , <i>Archis laevigana</i> κλπ) Φλοιφάγο έντομο (<i>Hylasinus oleiperda</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως.
---	----	--------------------

13.8. Λαγανικά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	75 (2,3)*	Ψεκασμοί καλύψεως
-Κρεμμύδι	Προγύμφες		
-Τομάτα	Λεπιδοπτέρων		
-Πιπεριά			

-Μελιτζάνα	και Μυιγών		
-Μπρόκολο			
-Κουνουπίδι	Ακάρεα	100-125	»
-Λάχανο	(<i>Tetranychus urticae</i>)	(1)*	
-Μαρούλι	Θρίπες		
-Σπανάκι	(<i>Thrips spp.</i>)		
	Αλευρώδης	125	»
	(<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
<u>13.9. Σπαράγγι</u> (στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της εγκατάστασης)	Μύγα σπαραγγιού (<i>Platyparea poecilotropa</i>)	75-125 (1)*	Δύο ή Τρεις ψεκασμοί καλύψεως στα στάδια: 1ος: Βλαστοί 3-5 εκ. 2ος: Βλαστοί 30-35 εκ. 3ος: 10-15 ημέρες μετά.
<u>13.10. Ψυχανθή</u> φασόλια ξερά φακές, αρακάς, ρεβύθια, κουκιά,	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i>)	75-125 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως
<u>13.11. Βαμβάκι</u>	Θρίπας (<i>Thrips tabacci</i>) Αφίδες (<i>Aphis gosypii</i>) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	75-150 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως
<u>13.12. Πατάτα</u>	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) Φθοριμαία (<i>Phthorimea operculella</i>)	75-100 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως.
<u>13.13. Καλαμπόκι</u>	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως
<u>13.14. Ζαγαρότευτλα</u>	Φθοριμαία (<i>Phthorimea operculella</i>) Πεγκόμυια (<i>Pegomyia hyoscyami</i>)	75	Ψεκασμοί καλύψεως.
	Αφίδες		

<u>13.15. Καπνός</u>	Θρίπας (<i>Thrips tabacci</i>) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	75-150 (1)*	Ψεκασμοί καλύψεως
<u>13.16. Καλλωπιστικά υπαίθρου</u> (πλήν των φυτών που αναφέρονται στη φυτοτοξικότητα)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	75-125 (1,4)*	Ψεκασμοί καλύψεως

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες.
3. Στα κραμβοειδή, ορισμένα γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα DIMETHOATE δεν έχουν καλή προσκολλητικότητα.
4. Στα καλλωπιστικά φυτά απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκόπια.
5. Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη λιανοληγά Κέρκυρας.
6. Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβοληγά.
7. Δεν χρησιμοποιείται σε ψεκασμούς υπερμικρού όγκου (ULV) για την καταπολέμηση του δάκου της εληάς.
8. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στη φιστικιά, γι' αυτό και πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του.

14. Φυτοτοξικότητα:

1. Είναι δυνατό να εμφανισθούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες αμπελιού, ροδακινιάς, συκιάς, καρυδιάς, τομάτας, φασολιών, βαμβακιού και ειδικά στη νεραντζιά.
2. Δεν χρησιμοποιείται στα χρυσάνθεμα, στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS και στην αζαλέα. Επιπλέον επειδή πιθανό να προκληθούν φυτοτοξικά φαινόμενα και σε άλλα καλλωπιστικά φυτά, θα πρέπει πριν από τη γενίκευση της χρήσης του να γίνεται αρχικά δοκιμαστική εφαρμογή του.
3. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στη φιστικιά και στο πεύκο-κουκουναριά.
4. Είναι δυνατό να προκαλέσει σκωριώχρωση στις ποικιλίες μηλιάς Red Delicious, Golden Delicious και σε μερικά καλλωπιστικά.
5. Στο σπαράγγι να χρησιμοποιείται μόνο σε καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της εγκατάστασης.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.

16. Σημάνσεις τοξικότητας : Xn, Επικίνδυνο Xi ,Ερεθιστικό

17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- (R10) Εύφλεκτο
(R20) Βλαβερό όταν εισπνέεται
(R21) Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα
(R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης
(R36/37/38) Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (RO1) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες
(RO6) Βλαβερό για τα ψάρια
(RO11/13/15) Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα, για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές
(S15/16) Μακριά από θερμότητα και από πηγές ανάφλεξης.
Απαγορεύεται το κάπνισμα.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S23) Μην εισπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
(S24/25) Αποφεύγεται επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
(S27) Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυνθείτε καλά.
(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά.
(S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο, αφού τα πλύνετε καλά με νερό
(SY1) Φοράτε μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, πλατύ καπέλο και ελαστικά αδιαπέραστα γάντια όταν χειρίζεσθε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
(SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
(SY10) Μην αυξάνετε τις δόσεις
(SY11) Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Αν ληφθεί από το στόμα, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο λαιμό με μη αιχμηρό αντικείμενο και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του μην προκαλέστε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα.

Αντίδοτο: Ατροπίνη, σε πιθανό συνδυασμό με 2-PAM, Toxogonin ή άλλους επαναδραστηριοποιητές της χοληνεστεράσης.. Μη χορηγείτε Μορφίνη ή άλλα ηρεμιστικά Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων:(01) 7793777

21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) :

- (SO1) Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τ' ανθισμένα ζιζάνια.
- (SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τις συσκευασίες του.
- (SO5) Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή επί 14 μέρες μετά τον ψεκασμό.

22.Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
 - Ελλά :Ψεκασμοί καλύψεως :**20** ημέρες
 - Δολωματικοί ψεκασμοί (LV) και (ULV):**15** ημέρες
- Εσπεριδοειδή: **20** ημέρες
- Ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, αμυγδαλιά, καρυδιά, λεπτοκαρυδιά,
συκιά, αμπέλι, καπνός : **25** ημέρες
- Κερασιά, βυσσινιά : **21** ημέρες για τη δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα νερό και
30 ημέρες για τη δόση 100-125 κ.εκ./100 λίτρα νερό
- Μηλιά, αχλαδιά: **30** ημέρες
- Βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, ψυχανθή (κουκιά, αρακάς κλπ.), πατάτες: **14** ημέρες
- Λαχανικά (εκτός από λάχανο και κρεμμύδι): **20** ημέρες.
- Λάχανο: **40** ημέρες
- Κρεμμύδια : **45** ημέρες

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

- (S7/8) Διατηρείται σε μέρος ξηρό και δροσερό με μέση ετήσια θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 25 °C, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας :

- α.Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ.1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της..

III. a. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004.**

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

K. ΒΡΕΤΤΟΣ