



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 2 - 12 - 2008
Αριθ. πρωτ: 124783**

**Προς: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Αγιαλείας 48
151 25 Μαρούσι
Αθήνα**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγραού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr**

(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1474
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC
(εντομοκτόνο) ως προς την
ημερομηνία λήξης του σκευάσματος,
τον παρασκευαστή της δ.ο, τα
εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.,
τον κάτοχο της έγκρισης, τον
υπεύθυνο για την τελική συσκευασία
και σήμανση, τον παρασκευαστή
του σκευάσματος, το εργοστάσιο
παρασκευής του σκευάσματος, τα
εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος, τις συσκευασίες του
σκευάσματος»**

- Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ.πρωτ. 172937/26.10.1983 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **1474** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC** (εντομοκτόνο).
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 121795/07.09.07 (ΦΕΚ/Β/1880/14-9-2007) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της 23^{ης} Απριλίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας dimethoate.
4. Τη με αρ. 90382/22-1-04 2000(ΦΕΚ/Β/200/4-2-2007) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας για τροποποίηση των εγκρίσεων των σκευασμάτων που περιέχουν dimethoate
5. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007)
6. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”»
7. Τις με αριθ. πρωτ. 115949/11.02.2008, 122750/28.09.2007 και 122749/28.09.2007 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθ. 1474 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC** (εντομοκτόνο) που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 172937/26.10.1983 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας ως προς:

- 1) την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος,
- 2) τον παρασκευαστή της δ.ο
- 3) τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.
- 4) τον κάτοχο της έγκρισης
- 5) τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση
- 6) τον παρασκευαστή του σκευάσματος
- 7) το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- 8) τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
- 9) τις συσκευασίες του σκευάσματος

και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

1474

26-10-1983

30-9-2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Dimethoate
(ομάδα
οργανοθειοφωσφορικοί
εστέρες)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**95 % (β/β)
min**

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Manufacturing plant: Cheminova A/S, Denmark
(η Δ/νση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Dimethoate προσδιορίζονται στο Τμήμα J του εγγράφου με ημερομηνία 122702 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 27-9-2007) που κατέθεσε ο παρασκευαστής της δ.ο. και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Αιγιάλειας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210-6860100 Fax: 210-6860200 E-mail: maria.tsinou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι
διαφορετικός από τον κάτοχο της
έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Αιγιάλειας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης BASF, Γερμανία (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
--

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης BASF, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία dimethoate 40 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες 59.35 % β/β Διαλύτες: Κυκλοεξανόνη, Ξυλόλη. Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με αριθ. Πρωτ. 115949/11.02.2008 της εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

Αριθμός: οκτώ (8)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100 κ.εκ., 250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο	Φιάλες αλουμινίου, φιάλες πλαστικές COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: α) Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπεκ τύπου κώνου, β) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου από εδάφους

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: α) Για τους ψεκασμούς φυλλώματος : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Β) Για τους δολωματικούς ψεκασμούς : πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση θα πρέπει να είναι εντονότερη.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλαιο πολτό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας..

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.
Καταπολεμά έντομα και ακάρεα.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Κερασιά	Ραγολέτιδα (Rhagoletis cerasi) Αφίδες (Myzus cerasi) Ρυγχίτης (Rhynchites bacchus) Ακάρεα (Panonychus ulmi)	187,5	75	100-250	Ψεκασμός καλύψεως.	1

Ελιά	Δάκος (Dacus oleae)	187,5	62,5	150-300	α. Ψεκασμοί καλύ- ψεως που αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή και όχι πριν από 20 ημέρες από τον προηγούμενο ψεκασμό.	4
	Δάκος (Dacus oleae)		0,3% δραστικής ουσίας στο δόλωμα	300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαζόμενο δέντρο	β. Δολωματικοί ψε- κασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επανα- λαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμαίων και των αποτελεσμάτων των δειγματολη- ψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολώ- ματος: 3 λίτρα ανά στρέμμα	
	Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) Φλοιοτρίβης (Phloeotribus scarabeoides) Ρυγχίτης (Rhynchites bacchus) Φυλλοφάγα έντομα (Lyonetia spp., Cacoecia rosana, Archis laevigana κλπ) Φλοιοφάγο έντομο (Hylasinus oleiperda)	187,5	62,5	150-300	Ψεκασμοί καλύψεως.	

Κρεμμύδι	Αφίδες (Myzus persicae) Προνύμφες Λεπιδοπτέρων και Μυιγών	37,5	75	40-50	Ψεκασμοί καλύψεως.	2
	Ακάρεα (Tetranychus urticae) Θρίπες (Thrips spp.)	62,5	100-125			
	Αλευρώδης (Trialeuroides vaporariorum)	62,5	125			
Παντζάρι Ραπανάκι	Αφίδες (Myzus persicae) Προνύμφες Λεπιδοπτέρων και Μυιγών	37,5	75	50	Ψεκασμοί καλύψεως.	2
	Ακάρεα (Tetranychus urticae) Θρίπες (Thrips spp.)	62,5	100-125			
	Αλευρώδης (Trialeuroides vaporariorum)	62,5	125			
Τομάτα αγρού Μελιτζάνα αγρού	Αφίδες (Myzus persicae) Προνύμφες Λεπιδοπτέρων και Μυιγών	75	75	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως.	2
	Ακάρεα (Tetranychus urticae) Θρίπες (Thrips spp.)	125	100-125			
	Αλευρώδης (Trialeuroides vaporariorum)	125	125			

Λάχανο Κουνουπίδι	Αφίδες (Myzus persicae) Προνύμφες Λεπιδοπτέρων και Μυιγών Ακάρεα (Tetranychus urticae) Θρίπες (Thrips spp.) Αλευρώδης (Trialeuroides vaporariorum)	75 100 100	75 100 100	100	Ψεκασμοί καλύψεως.	4
Μαρούλι αγρού και θερμοκηπίου	Αφίδες (Myzus persicae) Προνύμφες Λεπιδοπτέρων και Μυιγών Ακάρεα (Tetranychus urticae) Θρίπες (Thrips spp.) Αλευρώδης (Trialeuroides vaporariorum)	60 100 (αγρού) 60 (θερμοκηπίου) 100 (αγρού) 60 (θερμοκηπίου)	75 125 (αγρού) 75 (θερμοκηπίου) 125 (αγρού) 75 (θερμοκηπίου)	60-80	Ψεκασμοί καλύψεως.	4 (αγρού) 2 (θερμοκηπίου)
Σπαράγγι (στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της εγκατάστασης)	Μύγα σπαραγγιού (Platyedra poecilotropa)	100	75-100	50-100	Ψεκασμός καλύψεως.	1
Αρακάς	Αφίδες (Myzus persicae) Ακάρεα (Tetranychus urticae)	60	75-100	60	Ψεκασμοί καλύψεως.	3
Βαμβάκι	Θρίπες (Thrips spp.) Αφίδες (Aphis gossypii) Αλευρώδης (Bemisia tabaci) Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae)	120	75-150	50-80	Ψεκασμοί καλύψεως.	4

Πατάτα	Αφίδες (Myzus persicae) Φθοριμαία (Phthorimea operculella)	75	75	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως.	2
Ζαχαρότευτλα	Φθοριμαία (Phthorimea operculella) Πεγκόμνια (Pegomyia hyoscyami) Αφίδες (Myzus persicae)	30 50	75 125	40	Ψεκασμοί καλύψεως.	2
Καπνός	Θρίπες (Thrips tabaci) Αφίδες (Myzus persicae)	225	75-150	50-150	Ψεκασμοί καλύψεως.	4
Καλλωπιστικά υπαίθρου (πλην των φυτών που αναφέρονται στη φυτοτοξικότητα)	Αφίδες (Myzus persicae) Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae)	300	75-150	50-200	Ψεκασμοί καλύψεως.	4

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
- 2) Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες.
- 3) Στα Κραμβοειδή ορισμένα γαλακτωματοποιησίμα σκευάσματα DIMETHOATE δεν έχουν καλή προσκολλητικότητα.
- 5) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη λιανολιά Κέρκυρας.
- 6) Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στη κονσερβολιά.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μη ψεκάξετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή επί 14 μέρες μετά το ψεκασμό.

8

Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

Είναι δυνατό να εμφανιστούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες τομάτας και βαμβακιού.

Δεν χρησιμοποιείται στα χρυσάνθεμα, στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS και στην αζαλέα. Επιπλέον είναι πιθανό να προκληθούν φυτοτοξικά φαινόμενα και σε άλλα καλλωπιστικά φυτά, θα πρέπει πριν από τη γενίκευση της χρήσης του να γίνεται αρχικά δοκιμαστική εφαρμογή του.

Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πεύκο-κουκουναριά.

Είναι δυνατό να προκαλέσει σκωριώχρωση σε μερικά καλλωπιστικά.

9

Σήμανση
σκευάσματος:

Xn, Επιβλαβές

10

Φράσεις R

R 10, Εύφλεκτο.

R 21/22, Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

R 48/22, Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

RO 1, Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

11 Φράσεις S

S 1/2, Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
S 13, Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S 20/21, Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S 28, Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
S 36/37, Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S 46, Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

SO1, Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τ'ανθισμένα ζιζάνια.

SO5, Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από ψεκασμένα φυτά για 7 ημέρες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Αν ληφθεί από το στόμα, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο λαιμό με μη αιχμηρό αντικείμενο και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του μην προκαλέσετε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα.

Αντίδοτο: Ατροπίνη σε πιθανό συνδυασμό με 2-PAM, Τοxogonin ή άλλους επαναδραστηριοποιητές της χολινεστεράσης. Μην χορηγείτε Μορφίνη ή άλλα ηρεμιστικά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά : ψεκασμοί καλύψεως	21
Ελιά : δολωματικοί ψεκασμοί LV	14
Κερασιά	28
Αρακάς, Πατάτα	14
Κουνουπίδι, μαρούλι, μελιτζάνα, τομάτα, σπαράγγι	21
Ζαχαρότευτλα, παντζάρι, ραπανάκι	35
Κρεμμύδι, Λάχανο, Βαμβάκι	42

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος με μέση ετήσια θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 25 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-9-2009** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ε. Υ.**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**