



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 13 - 4 - 2009
Αριθ. πρωτ: 127958

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6736
έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
ΟΗΑΥΟ 50 SC (μυκητοκτόνο)
ως προς την ημερομηνία λήξης
του σκευάσματος, την
περιεκτικότητα της τεχνικά
καθαρής δραστικής ουσίας σε
καθαρή δραστική ουσία, το
ποσοστό των βοηθητικών
ουσιών, τα εργοστάσια
παρασκευής της δραστικής
ουσίας, τα εργοστάσια
παρασκευής του σκευάσματος,
τα μεγέθη συσκευασιών και το
φάσμα δράσης»

Προς: ISK Biosciences Europe, S.A.
Avenue Louise, 420 Bte. 12
B – 1050 Brussels,
(δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15
15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
(με απόδειξη)

- Κοιν.:**
- 1 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Κ. Κιλτίδη
 - 2 Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 - 3 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 - 4 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 - 5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 - 6 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 - 7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 - 8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ.πρωτ. 116050/20-11-2003 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **6736** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΟΗΑΥΟ 50 SC** (μυκητοκτόνο) και την με αρ. πρωτ. 123506/23/10/2008 Απόφαση με την οποία αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε.
3. Την 2008/108/ΕΚ της 26^{ης} /11/2008 Οδηγία της Επιτροπής με την καταχωρίστηκε η δραστική ουσία fluazinam στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
4. Την από 10-3-2009 εισήγηση της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων.
5. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α').
6. Τη με αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο
7. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
8. Τις με αριθ. πρωτ. 126299/24.02.09 και 127177/26-1-2009 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθ. **6736** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΟΗΑΥΟ 50 SC** (μυκητοκτόνο) που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 116050/20-11-2003 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας και ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 123506/23/10/2008 Απόφαση ως προς:

- 1) την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος,
 - 2) Την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
 - 3) Το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών
 - 4) Τα εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας
 - 5) Τα εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
 - 6) Τα μεγέθη συσκευασιών
 - 7) Το φάσμα δράσης
- και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

6736
20-11-2003
28-2-2013

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

ΟΗΑΥΟ
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Fluazinam
(ομάδα οξαζολών)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96 % (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ISK Biosciences Europe, S.A., Βέλγιο

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) Ishihara Sangyo Kaisha Ιαπωνίας
- 2) Union chemical Co. LTD, Κορέα
- 3) Dongbu Fine Chemicals Co. Ltd

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fluazinam προσδιορίζονται στο Τμήμα J του εγγράφου με ημερομηνία 126257 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 23-2-2009) που κατέθεσε ο παρασκευαστής της δ.ο. και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ISK Biosciences Europe, S.A.
Avenue Louise, 420 Bte. 12
B – 1050 Brussels,
ΒΕΛΓΙΟ
Τηλ.: 0032 / 2 / 627.86.11
Fax: 0032 / 2 / 627.86.00
E-mail: isk-gfe@isk.be

Υπεύθυνος επικοινωνίας
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15
15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ 210 6800900

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ISK Biosciences Europe, S.A.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) Ishihara Sangyo Kaisha Ιαπωνίας
- 2) Union chemical Co. LTD, Κορέα
- 3) Dongbu Fine Chemicals Co. Ltd

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα
Φθιώτιδας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία : Fluazinam 50 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 59.62% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του προσδιορίζονται στο έγγραφο με ημερομηνία 11-7-2002 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 102766) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες: 14 (δεκατέσσερις)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200 κ.εκ., 400 κ.εκ., 600 κ.εκ., 900 κ.εκ., 1 λίτρο, 2 λίτρα, 3 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυαιθυλενοτερεφθαλικός εστέρας (PET)

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείτε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με εισικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

5

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα ml/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα ml/ στρέμμα (μέγιστο)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κ ή περίοδο
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	100-150	100	150	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου: α. στην άνθηση, β. πριν το κλείσιμο της σταφυλής, γ. στο γυάλισμα και δ. στην ωρίμανση	4
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες ποικιλίες)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	100-150	100	150	Προληπτική εφαρμογή στην άνθηση	1
ΠΑΤΑΤΑ	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	30-40	100	40	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα	6

Παρατηρήσεις:

Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώτιο ψεκαστήρα διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας.

Στα σταφύλια, να μη συνδυάζεται με λάδια, dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

-

-

Μην μπαίνετε σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn -Επιβλαβές,
N -Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11 Φράσεις S

S_{1/2}: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
S₁₃: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S_{20/21}: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
S_{24/25}: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S_{36/37/39}: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, κατάλληλη προστατευτική μάσκα, γυαλιά και καπέλο.
S₄₆: σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S₆₀: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
S₆₁: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφάλειας
SY8: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
SY9: να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί.
Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν παρατηρηθούν αναπνευστικές δυσκολίες, ζητήστε τη βοήθεια γιατρού.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό και μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες)	Δεν απαιτείται καθώς η τελευταία εφαρμογή γίνεται στην άνθηση
Πατάτα	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **28-2-2011** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ε. Υ.**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**