



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης
Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 36 42 974
52 91 412

ΘΕΜΑ:"Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
PROSMETHYL 20 EC "

Αθήνα, 19 - 7 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 100740

- ΠΡΟΣ:** 1) ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.
Φράγκων 13
546 26 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
- Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/B/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
- Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/B/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.97) Π.Δ..
- Την με αριθ. 92392/26-3-99 απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **1808** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **ΓΚΟΥΣΑΙΤ-Μ 20 EC**.
- Τη με αριθ. 353001/13-04-2000 (ΦΕΚ 566/B/20.04.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
- Τις από 28-9-98, 21-7-99 και 6-9-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1876** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PROSMETHYL 20 EC
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** azinphos methyl 20% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 77,6% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 90% min.
5. **Παρασκευαστής :** ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., Φράγκων 13, 546 26 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
6. **Αντιπρόσωπος :** -----
7. **Τυποποιητής :** ΦΑΡΜΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ.
8. **Συσκευαστής:** ΦΑΡΜΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ.
9. **Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των **200**, & **500** κ.εκ. και **1** λίτρου με βιδωτό πώμα ασφαλείας.
9β. Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή COEX ή PET ή αλουμίνιο.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

- Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο δεσμεύον τη χολινεστεράση.
- Δρα δι' επαφής και από στομάχου.
- Μένει δραστικό για 15 ημέρες.

11.Τρόπος εφαρμογής : Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρι απορροής.

12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν από την χρήση
- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Αραιώστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης.

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|--|-------------------------------------|---|
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά) | Λεκάνιο (Saissetia oleae) Ψευδόκκοκος (Planococcus citri) Ακάρεα (3) (δράση μετρία) | 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) | Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Ανάρσια (Anarsia lineatella) Ανθονόμος (Anthonomus ornatus) | 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |

Φυλλορύκτες
 (Lyonetia spp.,
 Phyllonorycter corylifoliella,
 Ph. blancardella,
 Chemoistoma scitella)
 Φυλλοδέτες
 (Cacoecia rosana,
 Archips laevignana,
 Ar. variana,
 Ar. oxycaanthia,
 Ar. acentana)
 Βαμβακάδα
 (Eriosoma lanigerum)
 Κοκκοειδή:
 Ψώρα του San Jose
 (Quadraspidiotus
 perniciosus)
 Διασπίς
 (Diaspis pentagona)

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκιά, κερασιά, ροδακινιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά) | Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Ανάρσια (Anarsia lineatella) Ανθονόμος (Anthonomus ornatus) Φυλλορύκτες (Lyonetia spp., Phyllonorycter corylifoliella, Ph. blancardella, Chemoistoma scitella) Φυλλοδέτες (Cacoecia rosana, Archips laevignana, Ar. variana, Ar. oxycaanthia, Ar. acentana) Βαμβακάδα (Eriosoma lanigerum) Κοκκοειδή: Ψώρα του San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) Διασπίς (Diaspis pentagona) | 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |
|---|---|-----------|---|

| | | | |
|---------------|--|-----|---|
| ΑΜΠΕΛΙ | Ευδεμίδα (Lobesia botrana) Κογχλίδα (Clytia ambiguella) Τυλιγάδι | 200 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |
|---------------|--|-----|---|

| | | | |
|----------------|---|------------------------|--|
| | (Byctiseus betulae) Ερίνωση (3) (Eriophyes vitis) (Η δράση στην Ερίνωση είναι μετρία) | | |
| ΕΛΙΑ | Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) Λεκάνιο (Saissetia oleae) Ασπιδιωτός (Aspidiotus hedera) Μαργαρόνια (Margaronia unionalis) | 160 - 200 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. » |
| BAMBAKI | Πράσινο σκουλήκι (Heliothis spp.) Ρόδινο σκουλήκι (Platyedra gossypiella) Αφίδες (Aphis gossypii) Ανθονόμος (Anthonomus grayodis) Θρίπας (Thrips tabaci) Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) | 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |
| ΠΑΤΑΤΑ | Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) | 200 - 250 | Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές. |

Παρατηρήσεις:

1. Μέσα στο εύρος των συνιστώμενων κατά καλλιέργεια και εχθρό δόσεων η επιλογή της κατάλληλης δόσης γίνεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής και την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
2. Οι δόσεις σε κ.εκ./100 λίτρα νερού αφορούν ψεκασμούς μέχρι απορροής (run off).
3. Η δράση του φαρμάκου στα ακάρεα είναι μέτρια.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: **T, ΤΟΞΙΚΟ**

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10** Εύφλεκτο.
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

- RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
RO4 Πολύ τοξικό για τα γάρια.
RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
RO12/16 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
RO15 Βλαβερό για τα πουλιά.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακρυά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
S27 Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου και αναπνευστική συσκευή.
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
SY1 Φοράτε φόρμα, μπότες και ελαστικά γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συμβουλή, (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση δηλητηρίασης μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρείστε τον ζεστό και δώστε μεγάλη ποσότητα ιατρικού άνθρακα.

Αντίδοτο: Θειϊκή ατροπίνη και συμπληρωματικά TOXOGONIN ή 2-PAM.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- SO1** Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνεις.

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή.
Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

- A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- Π1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.
Ελιά: 60 ημέρες και όχι πέραν του τέλους Αυγούστου.
Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείστε το στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτα:

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ