



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
 Τηλέφωνο: 210 92 87 250
 e-mail: syg108@minagric.gr

Αθήνα, 28 - 12 - 2011
 Αριθ. πρωτ: 103870

Προς: **SBM DEVELOPPEMENT
SAS
(δια του κ. Γρ. Φαρίδη
Φυλής 232, 11252 Αθήνα)
(με απόδειξη)**

- Κοιν.: 1 **Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη**
 2 **Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα**
 3 **Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου**
 4 **Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους**
 5 **Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**
 6 **Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους**
 7 **ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα**
 8 **Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας**
 9 **Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) **SHERPA 100 EC** ”

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Καν. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού.
2. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/B/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Τον Καν. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου.
5. Τον Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκριμένων δραστικών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία cypermethrin.
6. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **2^ο θέμα της 4^{ης}/19-5-2011** Συνεδρίασής του.
7. Τη με αριθ. 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους με θέμα “Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά” η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α' 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
10. Την από 29-2-2008 αίτηση της εταιρείας SBM DEVELOPPMENT SAS.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Να χορηγηθεί οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρο 80 παρ.5α, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SHERPA 100 EC** της εταιρείας SBM DEVELOPMENT SAS, Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14373

28-12-2011

28- 2-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

SHERPA

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
κατά ISO cypermethrin
(ομάδα πυρεθρινοειδή)
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
min 930 g/kg
Bilag Industries Pvt Ltd (cis:trans 43:57)
United Phosphorus Limited (cis:trans 47:53)
- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:
SBM DEVELOPMENT, Γαλλίας
- δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) United Phosphorus Ltd, Ινδία
2) Bilag Industries Pvt Ltd, Ινδία
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας).
- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:
τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cypermethrin έχουν κατατεθεί με ημερομηνία 29-2-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 116580) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

ω) Κάτοχος της έγκρισης:

SBM DEVELOPPEMENT SAS
 42, Chemin Moulin Caron
 69130 Ecully
F R A N C E
 AME¹:
 Τηλ.:+ 33 491 244402/87
 Fax:+ 33 491 244467
 E-mail: xavier.peyron@sbm-dev.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 ΦΥΛΗΣ 232
 11252 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: 210 8623144
 FAX: 210 8663978

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SBM DEVELOPPEMENT, Γαλλίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SBM FORMULATION, Γαλλίας

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων :
 1) SBM DEVELOPPEMENT Γαλλίας
 2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ
 ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 3) K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ
 ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

¹ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (AME). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

cypermethrin: 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 88,4% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 29-2-2008 (Αρ. Πρ. Y.A.A.T. 116580) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50, 60, 80, 90, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 κ. εκ. και 1 L	HDPE, COEX (HDPE/PA).
2.	Μπιτόνι	2, 3 και 5 L	HDPE, COEX (HDPE/PA).

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα:-

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Εγθρός	Δόσεις σκευασμάτως			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα		
Αμπέλι	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>), Κοχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	30	30-60	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Φυλλώδη λαχανικά: Μαρούλι, (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	30	37,5-50	60-80	Με την εμφάνιση της προσβολής	1 εφαρμογή
	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>)					
Σολανώδη (Τομάτα, Μελιτζάνα) Υπαίθρου, Θερμοκηπίου	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	30	30-60	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	1 εφαρμογή
	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>)					
Σταυρανθή (Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο) Υπαίθρου	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>)	30	30	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μικρές δόσεις σκευασμάτως ανά 100λιτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευασμάτως ανά 100λιτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (30 κ. εκ.).						

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Διαχείριση ανθεκτικότητας:
		<ul style="list-style-type: none"> Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με SHERPA 100 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9

Σήμανση σκευάσματος:

Xn - Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

<p>S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.</p> <p>S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.</p> <p>S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια</p> <p>S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.</p> <p>S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα</p> <p>S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.</p> <p>“Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής”</p> <p>“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”</p> <p>S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.</p> <p>S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p> <p>H Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.</p> <p>SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ NEPO ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.</p> <p>Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αγέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού, και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm και 10 μέτρων για τα κηπευτικά των οποίων η ανάπτυξη είναι μικρότερη των 50 cm.</p> <p>Spe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αγέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm.</p> <p>Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και όλα έντομα επικονίαστις μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.</p> <p><u>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</u></p>

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μη δώσετε υγρά και να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 *Προστασία των καταναλωτών*

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
cypermethrin	Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	PHI(ημέρες)
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)	7
Μαρούλι (Υ, Θ)	7
Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ, Θ)	7 (Υπαίθρου) 3 (Θερμοκηπίου)
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως

15***Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες***

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16**Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**


Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B***Γενικές υποχρεώσεις***

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Καν. 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

I. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΔΑ:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Δ7- GAP

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

EEC No (α)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: Cypermethrin

:

SHERPA 100 EC

Insecticide

Pages :

Country :Greece

1	2	3	4	5	6	7					8			9	10	
Crop (a)	Country (b)	Product Name (c)	(F) (G) ή (I)	Pests or group of pests controlled	Formulation		Application					Rate per application			Phi (days) (k)	Remarks (l)
					Type (d-e)	Concentr ation ai (f)	Method of application (g-h)	Growth stage and season (j)	Number min max	Interval between applicatio ns min	gr ai / 100 L (i)	Water L / ha Min max .	Kg. ai /ha			
Grapes (table, wine)	Greece	SHERPA 100 EC	F	<i>Lobesia botrana</i> <i>Eupoecilia ambigua</i>	EC	100 g/lt	Spraying		2	14 -21		500-1000	0.03	7	-	
Lettuce	Greece	SHERPA 100 EC	F/G	<i>Heliothis armigera</i> <i>Myzus persicae</i>	EC	100 g/lt	Spraying		1	-		600-800	0.03	7		
Tomato, Aubergine (eggplant)	Greece	SHERPA 100 EC	F/G	<i>Heliothis armigera</i> <i>Myzus persicae</i>	EC	100 g/lt	Spraying		1	-		500-1000	0.03	7 F 3 G	-	
Cauliflower, Broccoli, Cabbage	Greece	SHERPA 100 EC	F	<i>Myzus persicae</i>	EC	100 g/lt	Spraying		2	14		1000	0.03	7	-	

- Παρατηρήσεις:
- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 - (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 - (γ) πχ. Μαστικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 - (δ) πχ. Βρέχιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμα συμπτήκωμα (EC)
 - (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 - (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
 - (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός. (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση