



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7211
 e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Αθήνα, 13-04-2016
 Αριθ. πρωτ: 2532/29558

Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας
 (δια του κ. Γ. Γαλένου,
 Αρτάκης 93, 17124-Νέα Σμύρνη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.491 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CAL-EX 1,8 EW (δραστική ουσία: abamectin)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση των δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
6. Τις με αριθ. πρωτ. 304/3280/12.1.16 και 2532/29558/8.3.16 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.491** έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CAL-EX 1,8 EW** (δρ. ουσία: abamectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασής μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 180/2693/11.2.15 Απόφασή μας, ως προς: α) το φάσμα δράσης και τους όρους της έγκρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015 και β) τα μεγέθη συσκευασίας.

Οι παράγραφοι 2, 5, 6 και 13 της με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

2 Συσκευασίες

| α/α | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Φιάλη | 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. και 1 λίτρο | COEX HDPE/PA |
| 2. | Φιάλη εντός κυτίου | 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. | COEX HDPE/PA, κουτί από χαρτόνι |
| 3. | Δοχείο | 3, 5 και 10 λίτρα | COEX HDPE/PA |

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων |
|--|--|--|--|------------------|---|---|
| | | Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | κ.εκ/ στρέμμα | | |
| ΕΣΠΙΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη) | Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>) | 30-40 | 100-200 | 30-80 | Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα | 3/7 ημέρες |
| | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Aceria sheldoni</i>) | | | | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών | |
| ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Bryobia rubricolis</i> , <i>Panonychus ulmi</i>) | 50-100 | 100-120 | 50-120 | Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων | 1 |
| ΜΗΛΙΑ | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>) | 80 | 75-120 | 60-96 | Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων | 2/15 ημέρες |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 50-100 | 75-120 | 37,5-120 | Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των νυμφών | 2/15 ημέρες |
| | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epitrimerus pyri</i> , <i>Eriophyes pyri</i> , <i>Panonychus ulmi</i>) | | | | Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων | |
| ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50-100 | 50-120 | 50-120 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων | 1 |
| ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50-100 | 50-100 | 25-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--|------------|
| ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i> , <i>Aculops lycopersici</i>) Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i>), <i>Toύτα</i> (<i>Tuta absoluta</i>), Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>) | 50-100 | 30-100 | 15-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών με την εμφάνιση των πρώτων στοών με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών | 3/7 ημέρες |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i>), Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 50-80 | 30-100 | 15-80 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών | 3/7 ημέρες |
| ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i> , <i>Eriophyes spp.</i>), | 50-100 | 30-100 | 15-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών | 3/7 ημέρες |
| ΠΕΠΩΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια, θερμοκήπιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i>), Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>), | 50-100 | 30-100 | 15-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών | 2/7 ημέρες |
| ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκήπιο) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>), Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>), | 50-100 | 30-100 | 15-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών | 2/7 ημέρες |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--|------------|
| ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των κραμβών. Ειδικότερα: -Λυκοτρίβιολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa) -Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), Σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), Σαλάτα iceberg, Μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)) - Σκαρόλα (πικρίδα) (αγριοκιχώριο, Κοκκινόφυλλο κιχώριο, Ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραζάκο/άγρια ραδίκια) - Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού ύλλουν), φύλλα γογγυλοκράμβης) | Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>), Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>), | 50-100 | 30-100 | 15-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών | 3/7 ημέρες |
|--|--|--------|--------|--------|--|------------|

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί | Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας». Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε εναλλαγή με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα. |
|---|--|---|

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειψμάτων (MRLs):

- α) Για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν μέχρι τις 8-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005.
- β) Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 9-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/2015.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ)

| Φυτικά προϊόντα | ΤΑΕ (ημέρες) |
|--|--------------|
| Εσπεριδοειδή | 10 |
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά | 14 |
| Αχλαδιά, Μηλιά | 3 |
| Αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο) | 10 |
| Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου) | 3 |
| Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (θερμοκηπίου) | 3 |
| Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (υπαίθρου) | 5 |
| Φράουλα(θερμοκηπίου) | 3 |
| Μαρούλι υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου (για τα είδη που αναγράφονται στην παρ. 5 ανωτέρω) | 7 |

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 180/2693/11.2.15 Απόφασή μας.

Γ. Η τροποποίηση ως προς τα μεγέθη συσκευασίας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

- Δ.** α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι (δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης).
- β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι (δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης και όχι πέραν τις 8-6-2016).
- γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
- δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παραπηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
- ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ